

# T-Dxd+Per

1コース期間 21日  
対象疾患 乳がん

| ルート | Rp | 薬剤名                                                                                   | 標準投与量                               | 投与方法 | 投与速度                                                 | day1 |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| 主管  | 1  | 5%ブドウ糖(100mL) 1B<br>デキサメタゾン 4.95mg<br>グラニセトロン(3) 1A<br>ホスネツピタント 235mg                 |                                     | div  | 200mL/hr<br>(30min)                                  | ○    |
|     | 2  | 5%ブドウ糖(100mL) 1B<br>★全開で5分投与して、残り破棄                                                   |                                     | div  | 全開                                                   | ○    |
|     | 3  | 5%ブドウ糖 100mL<br>注射用水20mL 【 】mL※<br>トラスツズマブ デルクステカン 【 】mg<br>※注射用水(mL)=DS-8201a(mg)÷20 | 5.4 mg/kg                           | div  | 初回:66.7mL/hr<br>(90min)<br>2回目以降:200mL/hr<br>(30min) | ○    |
|     | 4  | 5%ブドウ糖(100mL) 1B<br>★全開で5分投与して、残り破棄                                                   |                                     | div  | 全開                                                   | ○    |
|     | 5  | 生食(50mL) 1B                                                                           |                                     | div  | 全開                                                   | ○    |
|     | 6  | 生食(250mL) 1B<br>ペルツズマブ 【 】mg/body                                                     | 初回 840 mg/body<br>2回目以降 420 mg/body | div  | 初回:250mL/hr<br>(60min)<br>2回目以降:500mL/hr<br>(30min)  | ○    |
|     | 7  | 生食(50ml) 1B                                                                           |                                     | div  | 200mL/hr<br>(15min)                                  | ○    |

## コメント

### 【トラスツズマブデルクステカン】

- ・嘔気コントロール不良時はday2～デキサメタゾン4mg分1朝食後 2日間の追加を考慮。
- ・初回投与量は5.4mg/kgより開始する。1段階減量:4.4mg/kg→2段階減量:3.2mg/kg→中止

### 【ペルツズマブ】

- ・前回投与日から投与間隔が6週間以上の場合、ペルツズマブは初回投与量を再投与。