

対象：結腸、直腸がん

レジメン名：CPT-11+Cmab

1コース：14日間

| No. | 薬品名                                     | 投与量                              | 投与方法          | Day |   |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------|-----|---|
|     |                                         |                                  |               | 1   | 8 |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン<br>グラニセトロン<br>ホスネツピタント | 100mL<br>6.6mg<br>3mg<br>235mg   | 30分点滴         | ○   |   |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン                        | 100mL<br>6.6mg                   | 15分点滴         |     | ○ |
| 2   | 生理食塩液                                   | 50mL                             | 全開            | ○   | ○ |
| 3   | 生理食塩液<br>セツキシマブ                         | *500mL<br>**400mg/m <sup>2</sup> | ***<br>120分点滴 | ○   | ○ |
| 4   | 生理食塩液<br>イリノテカン                         | 500mL<br>150mg/m <sup>2</sup>    | 90分点滴         | ○   |   |
| 5   | 生理食塩液                                   | 50mL                             | 15分投与         | ○   | ○ |

※2回目以降は250mL

※※2回目以降は250mg/m<sup>2</sup>

※※※2回目以降は60分投与

備考

- ・点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服
- ・必要時、Mg補正を実施
- ・ヘパリン類似物質外用製剤、ミサイクリン（またはクレシロマイシン）処方
- ・必要時、ステロイド外用剤処方