

対象：結腸、直腸がん

レジメン名：IRIS+Cmab

1コース：28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 デキサメタゾン グラニセトロン	100mL 6.6mg 3mg	15分点滴	○		○	
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	15分点滴		○		○
2	生理食塩液 セツキシマブ	※500mL ※※400mg/m <sup>2</sup>	※※※ 120分点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液 イリノテカン	500mL 100mg/m <sup>2</sup>	90分点滴	○		○	
4	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○
内服	S1	80mg/m <sup>2</sup> /日	朝夕食後	day1夕→day15朝			

※2回目以降は250mL

※※2回目以降は250mg/m<sup>2</sup>

※※※2回目以降は60分投与

備考

<ul style="list-style-type: none"><li>・ day1.8.15.22 点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服</li><li>・ day1.15 アプレピタント125mg 時間指定</li><li>・ day2.3. 16.17 アプレピタント80mg 朝食後</li><li>・ S1用量 BSA1.25m<sup>2</sup>未満：80mg/日 1.25-1.5m<sup>2</sup>：100mg/日 1.5m<sup>2</sup>以上：120mg/日</li><li>・ 必要時、Mg補正を実施</li><li>・ ヘパリン類似物質油性クリーム処方</li><li>・ 必要時、ステロイド外用剤、ミサイクリン（またはクリスロマイシン）処方</li></ul>
--