対象::結腸、直腸がん

レジメン名:IRIS+Cmab

1コース:28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液	100mL	30分点滴	0		0	
	デキサメタゾン	6.6mg					
	パロノセトロン	0.75mg					
	ホスネツピタント	235mg					
1 ′	生理食塩液	100mL	15分点滴		0		0
	デキサメタゾン	6.6mg					
2	生理食塩液	50mL	全開	0		0	
3	生理食塩液	[*] 500mL	***	0	0	0	0
	セツキシマブ	**400mg/m²	120分点滴				
4	生理食塩液	500mL	90分点滴	0		0	
	イリノテカン	100mg/m²					
5	生理食塩液	50mL	15分点滴	0	0	0	0
内服	S1	80mg/㎡/日	朝夕食後	day1夕→day15朝			

※2回目以降は250mL

※※2回回目以降は250mg/m²

※※※2回目以降は60分投与

備考

・day1.8.15.22 点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服

·S1用量 BSA1.25㎡未満:80mg/日 1.25-1.5㎡:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日

- ・必要時、Mg補正を実施
- ・ヘパリン類似物質外用製剤、ミノサイクリン(またはクラリスロマイシン)処方
- ・必要時、ステロイド外用剤処方