

対象：結腸、直腸がん

レジメン名：mFOLFOX6+Bmab

1コース：14日間

| No. | 薬品名                                     | 投与量                                | 投与方法         | Day |
|-----|---|------------------------------------|--------------|-----|
|     |   |                                    |              | 1   |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン<br>パロノセトロン<br>ホスネツピタント | 100mL<br>4.95mg<br>0.75mg<br>235mg | 30分点滴        | ○   |
| 2   | 生理食塩液                                   | 50mL                               | 全開           | ○   |
| 3   | 生理食塩液<br>ベバシズマブ                         | *250mL<br>5mg/kg                   | **90分点滴      | ○   |
| 4   | 5%ブドウ糖液<br>オキサリプラチン                     | 250mL<br>85mg/m <sup>2</sup>       | 120分点滴       | ○   |
| 5   | 5%ブドウ糖液<br>レボホリナート                      | 250mL<br>200mg/m <sup>2</sup>      | 120分点滴       | ○   |
| 6   | 生理食塩液<br>5FU                            | 50mL<br>400mg/m <sup>2</sup>       | 15分点滴        | ○   |
| 7   | 生理食塩液                                   | 50mL                               | 全開           | ○   |
| 8   | 生理食塩液<br>5FU                            | 2400mg/m <sup>2</sup>              | 46時間<br>持続注入 | ○   |

※2回目以降は100mL

※※2回目は60分投与、3回目以降は30分投与

備考

|  |
|--|
|  |
|--|