

対象：結腸、直腸がん

レジメン名：mFOLFOXIRI+Cmab

1コース：14日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day	
				1	8
1	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 9.9mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○	
1'	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	15分点滴		○
2	生理食塩液	50mL	全開	○	
3	生理食塩液 セツキシマブ	※500mL ※※400mg/m ²	※※※ 120分点滴	○	○
4	生理食塩液 イリノテカン	250mL 150mg/m ²	90分点滴	○	
5	5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250mL 85mg/m ²	120分点滴	○	
6	5%ブドウ糖液 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120分点滴	○	
7	生理食塩液	50mL	※※※※全開	○	○
8	生理食塩液 5FU	2400mg/m ²	46時間 持続注入	○	

※2回目以降は250mL

※※2回目以降は250mg/m²

※※※2回目以降は60分投与

※※※※day8は15分投与

備考

- ・ day1.8 点滴開始時にジフェンヒドラミン50mg内服
- ・ day2~ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間
- ・ 必要時、Mg補正を実施
- ・ ヘパリン類似物質外用製剤、ミサイクリン（またはクリスロマイシン）処方
- ・ 必要時、ステロイド外用剤処方