

対象：胃がん

レジメン名：ニボルマブ360+CapeOX

1コース：21日間

| No. | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | Day | | |
|-----|---|--|--------|-----------------|---|----|
| | | | | 1 | ~ | 15 |
| 1 | 生理食塩液 ※クロルフェニラミン | ※※50mL 5mg | 15分点滴 | ○ | | |
| 2 | ※生理食塩液 | 50mL | 全開 | ○ | | |
| 3 | 生理食塩液 ニボルマブ | 100mL 360mg | 30分点滴 | ○ | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50mL | 全開 | ○ | | |
| 5 | 生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント | 100mL 3.3mg 0.75mg 235mg | 30分点滴 | ○ | | |
| 6 | 5%ブドウ糖液 オキサリプラチン デキサメタゾン | 500mL 130mg/m ² 3.3mg | 120分点滴 | ○ | | |
| 7 | 生理食塩液 | 50mL | 15分点滴 | ○ | | |
| 内服 | カペシタビン | 2000mg/m ² /日 | 朝夕食後 | ※※※day1夕→day15朝 | | |

※過敏症の懸念がある場合に使用

※※クロルフェニラミン使用時は

※※※day1朝→day14夕も可

備考

開始時にヘパリン類似物質油性クリームを処方