

チスレリズマブ+CapeOX

1コース期間: 21日

対象疾患: 胃がん

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時間	d1
1	生食 50mL ★ルートキープ用		div	200mL/h	15分	○
2	生食 50mL チスレリズマブ 200mg	200mg/body	div	初回: 50mL/hr 2回目以降100mL/hr	初回: 60分 2回目以降: 30分	○
3	生食 50mL		div		全開	○
4	生食 100mL パロノセトロン 0.75mg デキサメタゾン 3.3mg ホスネツピタント 235mg		div	200mL/h	30分	○
5	5%ブドウ糖液 500mL オキサリプラチン 【 】mg デキサメタゾン 3.3mg	130mg/m ²	div	250mL/h	120分	○
6	生食 50mL		div	200mL/h	15分	○
内服薬	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	分2	朝夕食後	Day1－14(day1夕～day15朝)

コメント

- ・嘔気コントロール不良時 Day2～3: DEX4mg 1日1回 朝食後内服(ただしICI投与中のため慎重に投与すること)
- ・Infusion reactionを認めた場合は、次サイクルより前投薬として解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン500mg)などの追加を考慮する。
- ・初回投与時、ヘパリン類似物質油性クリーム処方

カペシタビン投与量	
体表面積	1回量
1.36m ² 未満	1200mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1500mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1800mg
1.96m ² 以上	2100mg