

TP+Bmab

1コース期間: 21日

対象疾患: 卵巣癌

Rp	薬剤名	標準投与量	投与方法	投与速度	投与時間	d1
1	生食 100mL パロノセトロン 0.75mg ホスネツピタント 235mg デキサメタゾン 16.5mg ファモチジン 20mg クロルフェニラミン 5mg		div	200mL/hr	30min	○
2	生食50mL		div		全開	○
3	生食 250 mL(初回のみ) 生食100 mL(2回目以降) ペバシズマブ 【 】mg	15 mg/kg	div	初回167mL/hr 2回目 100mL/hr 3回目 200mL/hr	90min(初回) 60min(2回目) 30 min(3回目以降)	○
4	生食50mL		div		全開	○
5	生食 500mL 1B パクリタキセル 【 】mg	175 mg/m ²	div	166mL/hr	180min	○
6	ヴィーンD 500mL 硫酸Mg補正液 1mEq/mL 8mL		div	500mL/hr	60min	○
7	生食 500mL (-シスプラチン容量) シスプラチン 【 】mg total 500mL	50 mg/m ²	div	500mL/hr	60min	○
8	ヴィーンD 500mL		div	500mL/hr	60min	○
9	フロセミド 20mg 1A ★ヴィーンD投与開始5分以上経過後、 Tポートより投与		iv			○
10	ソルデム3A 500mL		div	500mL/hr	60min	○

コメント

- ・day2～ デキサメタゾン8mg(4mg× 2錠) 分1(朝食後) 3日間
- ・day1～4: オランザピン5mg 1日1回 夕食後内服。ただし、糖尿病患者には投与禁忌。75歳以上の患者、肥満患者には注意して使用すること。
- ・翌日から3日間 1L/日程度の水分摂取指導