

対象：慢性リンパ性白血病

レジメン名：オビヌツズマブ+アカラブルチニブ

1コース：28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day	Day	Day	Day
				1	***2	***8	***15
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液 オビヌツズマブ	*100mL **100mg	点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○
内服	アカラブルチニブ	200mg/日	朝夕食後	day1→day28			

※2回目以降は250mL

※※2回目は900mg、3回目以降は1000mg

※※※day2、day8、day15はC2のみ。C3-7はday1のみ。

備考

C1はアカラブルチニブ内服のみ

オビヌツズマブ投与30分前にロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服

アカラブルチニブとPPI、強い又は中等度のCYP3A4阻害・誘導剤との併用は可能な限り避けること。

アカラブルチニブとH2ブロッカーを併用する場合は、H2ブロッカー内服の2時間前にアカラブルチニブを内服すること。

アカラブルチニブと制酸剤（炭酸Ca、水酸化Mg、水酸化Alなど）を併用する場合は投与間隔を2時間以上空けること。