

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM維持

1コース：28日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
2	生理食塩液 トレメリムマブ	100mL 75mg	60分点滴	○
3	生理食塩液	50mL	全開	○
4	生理食塩液 デュルバルマブ	250mL ※1500mg	60分点滴	○
5	生理食塩液	50mL	全開	○
6	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 6.6mg	15分点滴	○
7	生理食塩液 ペメトレキシド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
8	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

※体重30kg以下の場合、20mg/kg

備考

- ・ペメトレキシド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。投与中止22日まで継続。
- ・ペメトレキシド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CDDP（1クール3w） or デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CBDCA（1クール3w）を4コース→デュルバルマブ+PEM（1クール4w）を1コース→デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM（1クール4w）を1クール→デュルバルマブ+PEM（1クール4w）を継続