

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CBDCA

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
2	生理食塩液 トレメリムマブ	100mL 75mg	60分点滴	○
3	生理食塩液	*100mL	**60分点滴	○
4	生理食塩液 デュルバルマブ	250mL ***1500mg	60分点滴	○
5	生理食塩液	*100mL	**60分点滴	○
6	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン	100mL 4.95mg 0.75mg	15分点滴	○
7	生理食塩液 ペメトレキシド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
8	生理食塩液	100mL	30分点滴	○
9	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250mL AUC：6	60分点滴	○
10	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

※2回目以降は50mL

※※2回目以降は全開

※※※体重30kg以下の場合、20mg/kg

備考

<ul style="list-style-type: none">・ day1 アプレピタント125mg 時間指定・ day2.3 アプレピタント80mg 朝食後(・ day2~ デキサメタゾン4mg 朝食後 3日間)・ ペメトレキシド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。投与中止22日まで継続。・ ペメトレキシド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。・ デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CBDCA (1クール3w) を4コース→デュルバルマブ+PEM (1クール4w) を1コース→デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM (1クール4w) を1クール→デュルバルマブ+PEM (1クール4w) を継続
--