

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：デュルバルマブ+トレメリムマブ+PEM/CDDP

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
2	生理食塩液 トレメリムマブ	100mL 75mg	60分点滴	○
3	生理食塩液	※100mL	※※60分点滴	○
4	生理食塩液 デュルバルマブ	250mL ※※※1500mg	60分点滴	○
5	生理食塩液	※100mL	※※60分点滴	○
6	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 9.9mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○
7	ヴィーンD	500mL	60分点滴	○
8	生理食塩液 ペメトレキシド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
9	生理食塩液 硫酸マグネシウム補正液	100mL 8mL	30分点滴	○
10	生理食塩液 シスプラチン	500mL 75mg/m ²	90分点滴	○
11	ヴィーンD 投与中にフロセミド20mg iv	500mL	60分点滴	○
12	ソルデム3A	500mL	60分点滴	○

※2回目以降は50mL

※※2回目以降は全開

※※※体重30kg以下の場合、20mg/kg

備考

- ・ day1~ オランザピン5mg 夕食後 4日間
- ・ day2~ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。
投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・ デュルバルマブ+トレメリマブ+PEM/CDDP（1クール3w）を4コース→
デュルバルマブ（1クール4w）+PEMを1コース→
デュルバルマブ+トレメリマブ+PEM（1クール4w）を1クール→
デュルバルマブ+PEM（1クール4w）を継続