

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：ニボルマブ360+イピリムマブ+PEM/CBDCA

1コース：42日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day	
				1	22
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○
2	生理食塩液 ニボルマブ	100mL 360mg	30分点滴	○	○
3	生理食塩液	100mL	30分点滴	○	
4	生理食塩液 イピリムマブ	30mL 1mg/kg	30分点滴	○	
5	生理食塩液	50mL		○	○
6	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 4.95mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○	○
7	生理食塩液 ペメトレキセド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○	○
8	生理食塩液	100mL	30分点滴	○	○
9	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250mL AUC：5-6	60分点滴	○	○
10	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○

備考

- ・ infusion reactionの懸念がある場合はニボルマブ投与30分前にジフェンヒドラミン50mg内服
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。