

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：ニボルマブ360+PEM/CBDCA

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
2	生理食塩液 ニボルマブ	100mL 360mg	30分点滴	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
4	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン	100mL 4.95mg 0.75mg	15分点滴	○
5	生理食塩液 ペメトレキセド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
6	生理食塩液	100mL	30分点滴	○
7	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250mL AUC：5	60分点滴	○
8	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

備考

- ・ infusion reactionの懸念がある場合はニボルマブ投与30分前にジフェンヒドラミン 50mg内服
- ・ day1 アプレピタント125mg 時間指定
- ・ day2,3 アプレピタント80mg 朝食後
- (・ day2~ デキサメタゾン4mg 朝食後 3日間)
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。