

対象：非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメン名：ニボルマブ360+PEM/CDDP

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	50mL	15分点滴	○
2	生理食塩液 ニボルマブ	100mL 360mg	30分点滴	○
3	生理食塩液	50mL	全開	○
4	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 9.9mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○
5	ヴィーンD	500mL	60分点滴	○
6	生理食塩液 ペメトレキセド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
7	生理食塩液 硫酸マグネシウム補正液	100mL 8mL	30分点滴	○
8	生理食塩液 シスプラチン	500mL 75mg/m ²	90分点滴	○
9	ヴィーンD 投与中にフロセミド20mg iv	500mL	60分点滴	○
10	ソルデム3A	500mL	60分点滴	○

備考

・ infusion reactionの懸念がある場合はニボルマブ投与30分前に ジフェンヒドラミン 50mg内服 ・ day1～ オランザピン5mg 夕食後 4日間 ・ day2～ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間 ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。 投与中止22日まで継続。 ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。 以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。 ・ CDDP投与前に500mLを目標に経口水分摂取を実施
