

対象：非小細胞肺癌

レジメン名：PEM/CBDCA+アミバンタマブ 2サイクル目以降

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液 クロルフェニラミン デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 5mg 4.95mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○
2	生理食塩液 ペメトレキシド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
3	生理食塩液	100mL	30分点滴	○
4	5%ブドウ糖液 カルボプラチン	250mL AUC：5	60分点滴	○
5	生理食塩液	50mL	全開	○
6	生理食塩液 アミバンタマブ	250mL ※体重80kg未満：1400mg/body ※※体重80kg以上：1750mg/body	120分点滴	○
7	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

※体重80kg未満：C3以降 1750mg /body

※※体重80kg以上：C3以降 2100mg /body

備考

- ・1サイクル目は入院にて投与
- ・点滴開始時に アセトアミノフェン 1000mg 内服
- ・必要時、Mg補正を実施
- ・ヘパリン類似物質外用製剤、ミサクリン（またはケリスロマイシン）処方（8週間まで）
- ・必要時、ステロイド外用剤処方
- ・ペメトレキシド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。
投与中止22日まで継続。
- ・ペメトレキシド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。