

対象：非小細胞肺癌

レジメン名：PEM/CDDP+Bmab

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 9.9mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○
2	生理食塩液	50mL	全開	○
3	生理食塩液 ベバシズマブ	*250mL 15mg/kg	**90分点滴	○
4	ソリューゲンG 硫酸マグネシウム補正液	500mL 8mL	50分点滴	○
5	生理食塩液 ペメトレキセド	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10分点滴	○
6	生理食塩液	100mL	30分点滴	○
7	生理食塩液 シスプラチン	500mL 75mg/m <sup>2</sup>	90分点滴	○
8	ソリューゲンG 投与中にフロセミド20mg iv	500mL	60分点滴	○
9	ソルデム3A	500mL	60分点滴	○

※2回目以降は100mL

※※2回目は60分点滴、3回目以降は30分点滴

備考

- ・ day2～ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。  
投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。  
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・ Rp3生理食塩液が100mLの場合はCDDP投与前に500mLを目標に経口水分摂取を実施。