

対象：非小細胞肺がん

レジメン名：PEM/CDDP + オシメルチニブ

1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン ホスネツピタント	100mL 9.9mg 0.75mg 235mg	30分点滴	○
2	ヴィーンD	500mL	60分点滴	○
3	生理食塩液 ペメトレキセド	100mL 500mg/m ²	10分点滴	○
4	生理食塩液 硫酸マグネシウム補正液	100mL 8mL	30分点滴	○
5	生理食塩液 シスプラチン	500mL 75mg/m ²	90分点滴	○
6	ヴィーンD 投与中にフロセミド20mg iv	500mL	60分点滴	○
7	ソルデム3A	500mL	60分点滴	○
内服	オシメルチニブ	80mg/日	朝食後	day1→day21

備考

- ・ day2～ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間
- ・ day1～ オランザピン5mg 夕食後 4日間
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。
投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・ ヘパリン類似物質外用製剤処方
- ・ ミサイクリン（またはクリスマイシン）は医師の判断で適宜投与