

対象：非小細胞肺癌、悪性胸膜中皮腫

レジメン名：PEM/CDDP(ショートハイドレーション)

1コース：21日間

| No. | 薬品名                                     | 投与量                               | 投与方法  | Day |
|-----|---|-----------------------------------|-------|-----|
|     |   |                                   |       | 1   |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン<br>パロノセトロン<br>ホスネツピタント | 100mL<br>9.9mg<br>0.75mg<br>235mg | 30分点滴 | ○   |
| 2   | ソリュージェンG<br>硫酸マグネシウム補正液                 | 500mL<br>8mL                      | 60分点滴 | ○   |
| 3   | 生理食塩液<br>ペメトレキセド                        | 100mL<br>500mg/m <sup>2</sup>     | 10分点滴 | ○   |
| 4   | 生理食塩液                                   | 250mL                             | 30分点滴 | ○   |
| 5   | 生理食塩液<br>シスプラチン                         | 500mL<br>75mg/m <sup>2</sup>      | 60分点滴 | ○   |
| 6   | ソリュージェンG<br>KCL<br>投与中にフロセミド20mg iv     | 500mL<br>10mEq                    | 60分点滴 | ○   |

備考

- ・ day2~ デキサメタゾン8mg 朝食後 3日間
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mg朝食後内服。  
投与中止22日まで継続。
- ・ ペメトレキセド初回投与の7日以上前にビタミンB12として1回1mg筋肉内投与。  
以降は投与中止後22日目まで9週に1回投与。
- ・ 点滴終了までに1Lを目標に経口水分摂取を実施