

対象：リンパ形質細胞性リンパ腫/ワルデンシュトレームマクログロブリン血症

レジメン名：BDR

C1→C2→C3→C4→C5の順番で投与

BDR C1 1コース：21日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	4	8	11
1	生理食塩液 ボルテゾミブ	必要量 1.3mg/m ²	皮下投与	○	○	○	○

BDR C2.C5 1コース：35日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL ※33mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液 リツキシマブ	250mL 375mg/m ²	点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○
4	生理食塩液 ボルテゾミブ	必要量 1.3mg/m ²	皮下投与	○	○	○	○

※内服の場合は40mg

BDR C3.C4 1コース：35日間

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 ボルテゾミブ	必要量 1.3mg/m ²	皮下投与	○	○	○	○

備考

C2、C5
day1 リツキシマブ投与30分前にロキソプロフェン60mg+クロルフェニラミン2mg内服