

対象：悪性リンパ腫

レジメン名：エプコリタマブ

1コース： 28日

1サイクル目 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
内服	デキサメタゾン ジフェンヒドラミン アセトアミノフェン	16mg/日 50mg/日 1000mg/日	内服	○	○	○	○
1	エプコリタマブ	0.16mg/kg	皮下投与	○			
2	エプコリタマブ	0.8mg/kg	皮下投与		○		
3	エプコリタマブ	3 or 48mg/kg※	皮下投与			○	
4	エプコリタマブ	48mg/kg	皮下投与				○

※濾胞性リンパ腫グレード1～3A：3mg、大細胞型B細胞リンパ腫、濾胞性リンパ腫グレード3B：48mg

投与30分-120分前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服
Day2～4、Day9～11、Day16～18、Day23～25：DEX16mg 分1 朝食後 内服

2・3サイクル目 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	エプコリタマブ	48mg/kg	皮下投与	○	○	○	○

備考

前投薬は原則不要であるが、前回投与後にGrade2または3のCRSが現れた場合は、
30-120分前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服
かつ Day2～4、Day9～11、Day16～18、Day23～25：DEX16mg 分1 朝食後 内服

4-9サイクル目 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	エプコリタマブ	48mg/kg	皮下投与	○		○	

備考

前投薬は原則不要であるが、前回投与後にGrade2または3のCRSが現れた場合は、
30-120分前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服
かつ Day2～4、Day16～18：DEX16mg 分1 朝食後 内服

10サイクル目以降 サイクル期間：28日

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	エプコリタマブ	48mg/kg	皮下投与	○			

備考

前投薬は原則不要であるが、前回投与後にGrade2または3のCRSが現れた場合は、
30-120分前までに前投薬（DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン）内服
かつ Day2～4：DEX16mg 分1 朝食後 内服