

対象：濾胞性リンパ腫

レジメン名：モスネツズマブ

1コース：28日間

1サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day		
				1	8	15
1	生理食塩液	100mL	60分点滴	○	○	○
2	生理食塩液 モスネツズマブ	100mL	240分点滴	○		
		1mg/body				
		100mL	240分点滴		○	
		2mg/body				
		190mL	240分点滴			○
		60mg/body				
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○

備考

モスネツズマブ投与1時間前にDEX20mg+ジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
TLS予防のため、投与時は水分摂取を十分行う。
TLS発症リスクが低または中程度の場合は、アロプリノール等を投与
本剤投与前に尿酸値が上昇した場合、またはTLSのリスクが高い場合は、ラスブリガーゼ等を投与

2サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day
				1
1	生理食塩液	100mL	60分点滴	○
2	生理食塩液 モスネツズマブ	※190mL ※※60mg/body	120分点滴	○
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○

※3サイクル以降は220mL

※※3サイクル以降は30mg/body

備考

モスネツズマブ投与1時間前にDEX20mg+ジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
3サイクル目以降の前投薬は原則不要であるが、休薬後6週間以内に再開する場合は前投薬投与
休薬後6週間以上経ってからの再開時は、day1：1mg、day8：2mg、day15：30mgで再開し、その後は
day1に30mgを投与