

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：DKd

1コース：28日間

### 1サイクル目

| No. | 薬品名                        | 投与量                                | 投与方法  | Day |   |   |   |    |    |    |
|-----|----------------------------|------------------------------------|-------|-----|---|---|---|----|----|----|
|     |                            |                                    |       | 1   | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン           | 100mL<br>16.5mg                    | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ※○ |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>蒸留水<br>カルフィルゾミブ | 50mL<br>必要量<br>20mg/m <sup>2</sup> | 30分点滴 | ○   | ○ |   |   |    |    |    |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>蒸留水<br>カルフィルゾミブ | 50mL<br>必要量<br>56mg/m <sup>2</sup> | 30分点滴 |     |   | ○ | ○ | ○  | ○  |    |
| 3   | 生理食塩液                      | 50mL                               | 15分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  |    |
| 4   | ダラキューロ <sup>®</sup>        | 15mL                               | 皮下投与  | ○   |   | ○ |   | ○  |    | ○  |

※day22は40mg（ダラキューロ投与1-3時間前までに内服）

#### 備考

ダラキューロ投与に際して

開始1-3時間前までにジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服

（infusion reactionがなければ2回目以降はアセトアミノフェン600mgに減量可能）

初回投与時は投与前日眠前と投与日朝にモンテルカスト10mg内服、以降の内服は医師判断で実施

COPDや気管支喘息のある場合や既往歴のある場合は投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドを考慮

76歳以上のデキサメタゾン投与量

day1,2,8,15：16.5mg day9,16：6.6mg day22：20mg（内服）

### 2サイクル目

| No. | 薬品名                        | 投与量                                | 投与方法  | Day |   |   |   |    |    |    |
|-----|----------------------------|------------------------------------|-------|-----|---|---|---|----|----|----|
|     |                            |                                    |       | 1   | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン           | 100mL<br>16.5mg                    | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ※○ |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>蒸留水<br>カルフィルゾミブ | 50mL<br>必要量<br>56mg/m <sup>2</sup> | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  |    |
| 3   | 生理食塩液                      | 50mL                               | 15分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  |    |
| 4   | ダラキューロ <sup>®</sup>        | 15mL                               | 皮下投与  | ○   |   | ○ |   | ○  |    | ○  |

※day22は40mg（ダラキューロ投与1-3時間前までに内服）

#### 備考

ダラキューロ投与に際して

開始1-3時間前までにジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服

（infusion reactionがなければ2回目以降はアセトアミノフェン600mgに減量可能）

投与前日眠前と投与日朝にモンテルカスト10mg内服を考慮

COPDや気管支喘息のある場合や既往歴のある場合は投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドを考慮

76歳以上のデキサメタゾン投与量

day1,8,15：16.5mg day22：20mg（内服）

### 3-6サイクル目

| No. | 薬品名                        | 投与量                   | 投与方法  | Day |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----|----------------------------|-----------------------|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|
|     |                            |                       |       | 1   | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 |    |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン           | 100mL<br>16.5mg       | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ※○ | ※○ |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>蒸留水<br>カルフィルゾミブ | 50mL<br>必要量<br>56mg/㎡ | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 3   | 生理食塩液                      | 50mL                  | 15分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 4   | ダラキューロ®                    | 15mL                  | 皮下投与  | ○   |   |   |   | ○  |    |    |    |    |

※day22,23は20mg内服

#### 備考

ダラキューロ投与に際して

開始1-3時間前までにジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服

(infusion reactionがなければ2回目以降はアセトアミノフェン600mgに減量可能)

投与前日眠前と投与日朝にモンテルカスト10mg内服を考慮

COPDや気管支喘息のある場合や既往歴のある場合は投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドを考慮

76歳以上のデキサメタゾン投与量

day1,15 : 16.5mg day8 : 9.9mg day9 : 9.9mg day22 : 20mg (内服)

### 7サイクル目以降

| No. | 薬品名                        | 投与量                   | 投与方法  | Day |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-----|----------------------------|-----------------------|-------|-----|---|---|---|----|----|----|----|----|
|     |                            |                       |       | 1   | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 |    |
| 1   | 生理食塩液<br>デキサメタゾン           | 100mL<br>16.5mg       | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  | ※○ | ※○ |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>蒸留水<br>カルフィルゾミブ | 50mL<br>必要量<br>56mg/㎡ | 30分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 3   | 生理食塩液                      | 50mL                  | 15分点滴 | ○   | ○ | ○ | ○ | ○  | ○  | ○  |    |    |
| 4   | ダラキューロ®                    | 15mL                  | 皮下投与  | ○   |   |   |   |    |    |    |    |    |

※day22, 23は20mg内服

#### 備考

ダラキューロ投与に際して

開始1-3時間前までにジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服

(infusion reactionがなければ2回目以降はアセトアミノフェン600mgに減量可能)

投与前日眠前と投与日朝にモンテルカスト10mg内服を考慮

COPDや気管支喘息のある場合や既往歴のある場合は投与後処置として気管支拡張薬、吸入ステロイドを考慮

76歳以上のデキサメタゾン投与量

day1 : 16.5mg day8,15 : 9.9mg day9,16 : 6.6mg day22 : 20mg (内服)