

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：EPd

1コース：28日間

### 1.2サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
内服	デキサメタゾン	*28mg/日	朝食後	○	○	○	○
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 6.6mg 20mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液	100mL	45分点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液 蒸留水 エロツズマブ	必要量 必要量 10mg/kg	*** 約150分 点滴	○	○	○	○
4	生理食塩液		15分点滴	○	○	○	○
内服	ポマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-21			

※75歳を超える場合は8mg/日

※※day8は約90分点滴、day15以降約60分点滴

#### 備考

<ul style="list-style-type: none"><li>・エロツズマブ 開始3-24時間前までにデキサメタゾンを内服</li><li>・エロツズマブ 開始45分前までにデキサメタゾン6.6mgを点滴</li><li>・エロツズマブ 開始前にジフェンヒドラミン25-50mg+アセトアミノフェン300-1000mg内服</li><li>・ポマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用</li></ul>
---

### 3サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
内服	デキサメタゾン	*28 or 40mg/日	朝食後	28mg	40mg	40mg	40mg
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 6.6mg 20mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液	100mL	45分点滴	○			
3	生理食塩液 蒸留水 エロツズマブ	必要量 必要量 20mg/kg	**約90分 点滴	○			
4	生理食塩液		15分点滴	○			
内服	ポマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-21			

※75歳を超える場合はday1は8mg/日、day8.15.22は20mg/日

※※2回目以降は約60分点滴

#### 備考

<ul style="list-style-type: none"> <li>・エロツズマブ 開始3-24時間前までにデキサメタゾンを内服</li> <li>・エロツズマブ 開始45分前までにデキサメタゾン6.6mgを点滴</li> <li>・エロツズマブ 開始前にジフェンヒドラミン25-50mg+アセトアミノフェン300-1000mg内服</li> <li>・ポマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用</li> </ul>
--