

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：ERd

1コース：28日間

1.2サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
内服	デキサメタゾン	28mg/日	朝食後	○	○	○	○
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 6.6mg 20mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液	100mL	45分点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液 蒸留水 エロツズマブ	必要量 必要量 10mg/kg	※ 約150分 点滴	○	○	○	○
4	生理食塩液		15分点滴	○	○	○	○
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21			

※day8は約90分点滴、day15以降約60分点滴

備考

- ・エロツズマブ 開始3-24時間前までにデキサメタゾンを内服
- ・エロツズマブ 開始45分前までにデキサメタゾン6.6mgを点滴
- ・エロツズマブ 開始前にジフェンヒドラミン25-50mg+アセトアミノフェン300-1000mg内服
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

3サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
内服	デキサメタゾン	28 or 40mg/日	朝食後	28mg	40mg	28mg	40mg
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 6.6mg 20mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液	100mL	45分点滴	○		○	
3	生理食塩液 蒸留水 エロツズマブ	必要量 必要量 10mg/kg	約60分 点滴	○		○	
4	生理食塩液		15分点滴	○		○	
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21			

備考

- ・エロツズマブ 開始3-24時間前までにデキサメタゾンを内服
- ・エロツズマブ 開始45分前までにデキサメタゾン6.6mgを点滴
- ・エロツズマブ 開始前にジフェンヒドラミン25-50mg+アセトアミノフェン300-1000mg内服
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用