

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：IsaKd

1コース：28日間

1サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day							
				1	2	8	9	15	16	22	23
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○		○		○		○	
1´	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴		○		○		○		
1´´	デキサメタゾン内服	20mg	内服								○
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○		○		○		○	
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	day1・8は点速を 段階的にアップして点滴 day15以降、75分点滴	○		○		○		○	
4	生理食塩液		15分点滴	○		○		○			
5	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 必要量 20mg/m ²	30分点滴	○	○						
5´	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 必要量 56mg/m ²	30分点滴			○	○	○	○		
6	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○	○	○	○	

備考

・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服

2サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day							
				1	2	8	9	15	16	22	23
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○				○			
1´	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴		○	○	○		○		
1´´	デキサメタゾン内服	20mg	内服							○	○
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○				○			
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	75分点滴	○				○			
4	生理食塩液	50mL	15分点滴	○				○			
5	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 必要量 56mg/m ²	30分点滴	○	○	○	○	○	○		
6	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○	○	○		

備考

・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
・1サイクルでinfusion reactionがなければファモチジン、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンの投与は省略可