

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：IsaPd

1コース：28日間

1サイクル目

| No. | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | Day | | | |
|-----|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------|---|----|----|
| | | | | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 1 | 生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン | 100mL *33mg 20mg | 30分点滴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 生理食塩液 | 50mL | 15分点滴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 生理食塩液 イサツキシマブ | 250mL 10mg/kg | 投与日、体重 ごとに点滴 時間は調節 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 生理食塩液 | | 15分点滴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内服 | ボマリドミド | 4mg/日 | 夕食後 | day1-21 | | | |

※75歳以上の場合は16.5mg/日

備考

- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
- ・ボマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

2サイクル目以降

| No. | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | Day | | | |
|-----|----------------------------|------------------------|--------------------------|---------|---|----|----|
| | | | | 1 | 8 | 15 | 22 |
| 1 | 生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン | 100mL *33mg 20mg | 30分点滴 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 生理食塩液 | 50mL | 15分点滴 | ○ | | ○ | |
| 3 | 生理食塩液 イサツキシマブ | 250mL 10mg/kg | 投与日、体重 ごとに点滴 時間は調節 | ○ | | ○ | |
| 4 | 生理食塩液 | | 15分点滴 | ○ | | ○ | |
| 内服 | ボマリドミド | 4mg/日 | 夕食後 | day1-21 | | | |

※75歳以上の場合は16.5mg/日

- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
- ・デキサメタゾンの点滴は内服に変更可（40mg/日）
- ・1サイクルでinfusion reactionがなければファモチジン、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンの投与は省略可
- ・ボマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用