

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：IsaPd

1コース：28日間

1サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL ※33mg 20mg	30分点滴	○	○	○	○
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	day1・8は点速を 段階的にアップして点滴 day15以降、75分点滴	○	○	○	○
4	生理食塩液		15分点滴	○	○	○	○
内服	ボマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-21			

※75歳以上の場合は16.5mg/日

備考

- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
- ・ボマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

2サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	8	15	22
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL ※33mg 20mg	30分点滴	○	○**	○	○**
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○		○	
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	75分点滴	○		○	
4	生理食塩液		15分点滴	○		○	
内服	ボマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-21			

※75歳以上の場合は16.5mg/日

**day8、15はDEXのみ

- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
- ・デキサメタゾンの点滴は内服に変更可（40mg/日）
- ・1サイクルでinfusion reactionがなければファモチジン、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンの投与は省略可
- ・ボマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用