

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：IsaVRd

1コース：1～4サイクルは42日間、5サイクル以降は28日間

1サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○		○		○	○		○		
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○		○		○	○		○		
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	day1・8は点速を 段階的にアップして点滴 day15以降、75分点滴	○		○		○	○		○		
4	生理食塩液		15分点滴	○		○		○	○		○		
5	ボルテゾミブ	1.3mg/㎡	皮下注射	○	○	○	○		○	○	○	○	
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-14、day22-35									

備考

- ・DEX20mg内服（day2、4、5、9、11、12、23、25、26、30、32、33（75歳以上は、day4、11、25、32）
- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロビトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

2～4サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン※	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○				○			○		
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○				○			○		
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	75分点滴	○				○			○		
4	生理食塩液		15分点滴	○				○			○		
5	ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	皮下注射	○	○	○	○		○	○	○	○	
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-14、day22-35									

備考

- ・DEX20mg内服（day2、4、5、9、11、12、23、25、26、30、32、33（75歳以上は、day4、11、25、32）
- ・イサツキシマブ投与前にジフェンヒドラミン50mg+アセトアミノフェン1000mg内服。
ただし、※ファモチジンおよびジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンはIRなければ省略できる。
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロビトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

5～17サイクル目

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン※	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○				○					
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○				○					
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	75分点滴	○				○					
4	生理食塩液		15分点滴	○				○					
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21									

- ・DEX20mg内服：day8、22
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロビトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

18サイクル目以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	4	8	11	15	22	25	29	32	
1	生理食塩液 デキサメタゾン ファモチジン※	100mL 16.5mg 20mg	30分点滴	○									
2	生理食塩液	50mL	15分点滴	○									
3	生理食塩液 イサツキシマブ	250mL 10mg/kg	75分点滴	○									
4	生理食塩液		15分点滴	○									
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21									

- ・DEX20mg内服：day8、15、22
- ・レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロビトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用