

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：KRd

1コース：28日間

1サイクル

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	2	8	9	15	16	22	23		
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○	○	○	○	○	○				
2	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 20mg/m ²	10分投与	○	○								
2	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 27mg/m ²	10分投与			○	○	○	○				
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○	○	○				
内服	デキサメタゾン	20mg/日	朝食後							○	○		
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21									

備考

<ul style="list-style-type: none">・ day1.2.8.9.15.16のデキサメタゾンは内服に変更可（20mg/日）・ レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

2-12サイクル

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day									
				1	2	8	9	15	16	22	23		
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○	○	○	○	○	○				
2	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 27mg/m ²	10分投与	○	○	○	○	○	○				
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○	○	○	○	○				
内服	デキサメタゾン	20mg/日	朝食後							○	○		
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21									

備考

<ul style="list-style-type: none">・ day1.2.8.9.15.16のデキサメタゾンは内服に変更可（20mg/日）・ レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

13-18サイクル

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day							
				1	2	8	9	15	16	22	23
1	生理食塩液 デキサメタゾン	100mL 16.5mg	30分点滴	○	○			○	○		
2	5%ブドウ糖液 蒸留水 カルフィルゾミブ	50mL 27mg/m ²	10分投与	○	○			○	○		
3	生理食塩液	50mL	15分点滴	○	○			○	○		
内服	デキサメタゾン	20mg/日	朝食後			○	○			○	○
内服	レナリドミド	25mg/日	朝食後	day1-21							

備考

- ・ day1.2.15.16のデキサメタゾンは内服に変更可（20mg/日）
- ・ レナリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用