

対象：多発性骨髄腫

レジメン名：PVd

1コース：21日間

1-8サイクル

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day							
				1	2	4	5	8	9	11	12
1	生理食塩液 ボルテゾミブ	必要量 1.3mg/m ²	皮下投与	○		○		○		○	
内服	デキサメタゾン	※20mg/日	朝食後	○	○	○	○	○	○	○	○
内服	ポマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-14							

※76歳以上は10mg/日あるいはそれ以下への減量を考慮

備考

・ポマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用

9サイクル以降

No.	薬品名	投与量	投与方法	Day			
				1	2	8	9
1	生理食塩液 ボルテゾミブ	必要量 1.3mg/m ²	皮下投与	○		○	
内服	デキサメタゾン	※20mg/日	朝食後	○	○	○	○
内服	ポマリドミド	4mg/日	夕食後	day1-14			

※76歳以上は10mg/日あるいはそれ以下への減量を考慮

備考

・ポマリドミド服用中、患者のリスクに応じてアスピリン腸溶錠、エドキサバン、クロピトグレル、低分子ヘパリン、ワルファリンを使用