## トアルクエタマブB法(q2w, 漸増期)

1コース期間: 20~24日

所要時間:

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時間	day 1	day 4	day 8	day 11
内服	デキサメタゾン 16mg ジフェンヒドラミン50mg アセトアミノフェン1000mg内服		内服	トアルクエタマブ皮下注投与 1〜3時間前に内服		0	0	0	0
1	トアルクエタマブ 【 】mg	0.01 mg/kg	SC.			0			
1'	トアルクエタマブ 【 】mg	0.06 mg/kg	øc				0*		
1"	トアルクエタマブ 【 】mg	0.4 mg/kg						O*	
1'''	トアルクエタマブ 【 】mg	0.8 mg/kg	sc						O*

## コメント

\*前回投与から2~4日ごとであれば投与日変更可

トアルクエタマブ投与前に前投薬(DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン)を内服投与すること。 漸増期(1~4回目投与)は必ず入院管理とする。

## トアルクエタマブB法(q2w, 継続投与期)

1コース期間: 28日

所要時間:

Rp	薬剤名	投与量	投与方法	投与速度	投与時間	day 1	day 15
	デキサメタゾン 16mg ジフェンヒドラミン50mg アセトアミノフェン1000mg内服		内服 トアルクエタマブ皮下注投与 1~3時間前に内服			休薬後に再開する場合、内服	
1	トアルクエタマブ 【 】mg	0.8 mg/kg	sc			0	0

## コメント

体薬後に再開する場合は、トアルクエタマブ投与前に前投薬(DEX、ジフェンヒドラミン、アセトアミノフェン)を内服投与すること。