

塩酸バンコマイシン散 0.5g

【調剤方法】 1回服用量が10mLになるように水で溶解、希釈する。

塩化ナトリウムカプセル

【調剤方法】 塩化ナトリウム 0.5g を2号カプセルに充填し、1回分ずつ分包し、交付。
分包にはパイルパッカーを用いる。

着色硫酸アトロピン 0.1%散

【処方】	(毒)硫酸アトロピン	100mg
	食用青色1号アルミニウムレーキ	10mg
	乳糖(末)	24.9g
	乳糖(粒状)	75g

全量 100g

【調剤方法】 1)食用青色1号アルミニウムレーキを10mg秤量し、乳鉢に入れる。
2)硫酸アトロピン100mgを秤量し、1)と均等に混和する。
3)2)に、篩過した乳糖(末)約5gを少しずつ加え、均等に混和する。
4)残りの乳糖(末)を少しずつ加えながら混合する。
5)十分に混合した後、篩過した乳糖(粒状)を75g秤量し、少しずつ加えながら、乳棒を用いて十分に混合する。
1)~5)により倍散を調製し、必要用量を秤量し、調剤する。

プリビナ点鼻液(5mL)

【調剤方法】 0.05%プリビナ液を5mLずつ褐色点眼容器(5mL)にミリポアフィルター(マイレクスGS 0.22 μ m)を用いて分注する。

プログラフ顆粒(0.2mg/包)の分包

【調剤方法】 プログラフ顆粒の1回量が0.2mg以下の場合、他の薬剤とのコンタミネーションを避けるため、パイルパッカーを用いて1回量ずつ分包する。