

## **塩酸バンコマイシン散0.5g**

【調剤方法】1 回服用量が10mL になるように水で溶解、希釈する。

## **塩化ナトリウムカプセル**

【調剤方法】塩化ナトリウム0.5g を2 号カプセルに充填し、1 回分ずつ分包し、交付。  
分包にはパイルパッカーを用いる。

## **着色硫酸アトロピン0.1%散**

【処方】(毒)硫酸アトロピン100mg  
食用青色1 号アルミニウムレーキ10mg  
乳糖(末) 24.9g  
乳糖(粒状) 75g  
全量100g

【調剤方法】1)食用青色1 号アルミニウムレーキを10mg 秤量し、乳鉢に入れる。  
2)硫酸アトロピン100mg を秤量し、1)と均等に混和する。  
3)2)に、篩過した乳糖(末)約5g を少しづつ加え、均等に混和する。  
4)残りの乳糖(末)を少しづつ加えながら混合する。  
5)十分に混合した後、篩過した乳糖(粒状)を75g 秤量し、少しづつ加えながら、乳棒を用いて十分に混合する。  
1)～5)により倍散を調製し、必要用量を秤量し、調剤する。

## **プリビナ点鼻液(5mL)**

【調剤方法】0.05%プリビナ液を5mLずつ褐色点眼容器(5mL)にミリポアフィルター(マイレクスGS 0.22 μ m)を用いて分注する。

## **プログラフ顆粒（0.2mg/包）の分包**

【調剤方法】プログラフ顆粒の1 回量が0.2mg 以下の場合、他の薬剤とのコンタミネーションを避けるため、パイルパッカーを用いて1 回量ずつ分包する。

## **ネブライザード液**

【調剤方法】1本300mL中：プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2% 30mL, 生理食塩液 270mL を混合する。